



14. Znamením, že v úle není matka a vajíčka klade dělnice – trubčice je

- a) vajíčka jsou oplozená a je jich v buňce více
- b) vajíčka jsou nakladena častěji na bok buňky a je jich v ní více**
- c) vajíčka mají jinou – tmavší barvu než obvykle

15. Včelí dělnice váží přibližně

- a) 50 mg
- b) 100 mg**
- c) 200 mg

16. Včela má na hlavě

- a) 2 složené a 2 jednoduché oči
- b) 3 složené a 2 jednoduché oči
- c) 2 složené a 3 jednoduché oči**

17. K přezimování záložních matek jsou vhodné

- a) oplodňáčky
- b) školovací klíčky
- c) množárny**

18. Včelomorka je

- a) druh mouchy**
- b) druh roztoče
- c) druh brouka

19. V předjaří kvete

- a) javor mléč**
- b) jírovec maďal
- c) jabloň domácí

20. Mateří kašičku získává včelař z matečnickových misek

- a) před zaklazením matkou
- b) s mladou larvou
- c) s larvou před zavíčkováním**

21. Pro tzv. tichou výměnu je charakteristické

- a) vytvoření do 5 matečnicků, matka nepřestává klást vajíčka**
- b) vytvoření do 5 matečnicků, matka přestane klást vajíčka
- c) vytvoření 20 matečnicků, matka v době zavíčkování přestává klást

22. Jak vzniká vosk

- a) je „vypocován“ voskotvornými zrcadélky na zadečku**
- b) je produkován hltanovými žlázami dělnic
- c) včely ho sbírají v přírodě

23. Hnědé pylové rousky včelám poskytují

- a) svazenka
- b) řepka
- c) jetel plazivý**

24. První včelařská škola v Čechách byla

- a) v Dole u Libčic
- b) v Nasavrkách u Chrudimi
- c) v Novém Kníně**

25. Mezerník slouží k nastavení

- a) výšky česnového otvoru
- b) mezinástavkové mezery
- c) meziplástové mezery**

26. Včelařův rok začíná

- a) v předjaří
- b) na jaře
- c) v podletí**

27. Akátová snůška probíhá

- a) v časném létě**
- b) v plném létě
- c) v podletí